



Extracto

Posicionamiento Grupo de Especialidad de Medicina Felina de AVEPA

En los últimos años ha aumentado la concienciación social sobre el manejo humano y racional de colonias felinas. En ocasiones es un tema complicado para aquellas personas implicadas en su cuidado. Hay políticas sobre ello desde las administraciones, a veces polémicas además de que

Por ello desde **GEMFE-AVEPA** se ha propuesto una guía para protocolos de actuación para veterinarios que se inicien en la medicina de protectoras felinas, para las protectoras/asociaciones que quieran mejorar el trabajo con los gatos de la calle y para quienes necesiten información fiable, ordenada y contrastada sobre la medicina de colectividades urbanas felinas. Debería ser una base para que los veterinarios, con argumentos científicos, aconsejen a la administración cuando solicite su colaboración.

Buscamos solución a los problemas asociados a la presencia de colonias de gatos callejeros para mejorar su calidad de vida, reducir el impacto sobre la fauna salvaje y evitar el potencial riesgo sobre la salud pública.

La naturaleza de los gatos

Son carnívoros y muy territoriales, aunque pueden formar pequeños grupos familiares (normalmente hembras y su descendencia). Las hembras tienen dos períodos de celo: uno más corto a finales de verano y otro más largo a finales de invierno. Su éxito reproductivo es elevado. La gestación es de aproximadamente 8 semanas. El periodo de lactación ideal para los gatitos es de dos meses, aunque a las 3-4 semanas ya pueden iniciar la alimentación no láctea con comida húmeda y pienso de gatito. Sobre los seis meses alcanzan la **madurez sexual**, aunque puede ser variable, depende de la genética, la alimentación y del ambiente donde se encuentran.

De las necesidades de alimentación

Una dieta pobre en proteína animal provoca problemas de salud, entre otros cardiomiopatía dilatada, degeneración retiniana o cálculos en las vías urinarias. Por este motivo es recomendable alimentarlos con un pienso que cubra el 100% de las necesidades de los gatos ya que contribuye a:

- mejor desarrollo del sistema inmune.
- disminución de la cantidad ingerida por los gatos.
- disminución del volumen y mejora de la textura de las heces.

La ubicación de los comederos es importante. Si no están bien distribuidos, puede haber estrés entre los gatos que dará lugar a alteraciones de comportamiento y procesos patológicos. Los comederos se distribuyen en 3 o más puntos según la cantidad de animales y del espacio disponible y sobre espacios fáciles de desinfectar. Esas zonas deben mantenerse muy limpias y asegurarnos que, una vez alimentados, no quede comida que pueda atraer insectos ratas. Y es más importante si hablamos de comida húmeda (casera o en latas). Este alimento se estropea mucho más rápido y los

gatos no se lo comerán pasadas unas horas, pudiendo ser fuente de problemas con los vecinos. Lo mejor es el pienso.

¿Cómo saber si la cantidad suministrada a una colonia es suficiente?:

“Si la ración se consume en menos de 15 minutos habrá que aumentarla. Si permanece más de una hora deberá ser reducida.”

Tiene que haber agua limpia las 24 h del día. En algunas poblaciones es necesario un permiso o carnet para alimentar y atender a los gatos callejeros. Es importante conocer las ordenanzas municipales de cada localidad.

De las necesidades de eliminación.

Los gatos tienen que ser muy limpios y necesitan un lugar adecuado para sus deposiciones. Es útil disponer de zonas de eliminación, tanto por los gatos, como por los vecinos. Que no estén próximos a la comida. Los areneros se disponen en zonas de fácil acceso para limpiarlos frecuentemente, lejos de por donde pasan peatones (que agradecerán evitar malos olores). Si no se tiene el cuidado suficiente, tarde o temprano habrá problemas con los vecinos.

De la limpieza y la desinfección.

La limpieza y desinfección son dos tareas esenciales en una colonia. Permiten que más animales puedan convivir en condiciones de higiene adecuadas, disminuyendo el contagio de enfermedades infecciosas y la sensación de suciedad del entorno. Esto favorece la imagen ante el vecindario y disminuye los conflictos.

La limpieza es la eliminación de la suciedad que se ve a simple vista. Desinfección es la eliminación de la suciedad microscópica y potencialmente infecciosa (virus, bacterias y hongos). Las dos son necesarias pues no hay desinfección sin limpieza y viceversa.

Los limpiadores más utilizados son los jabones como lavavajillas. El desinfectante más común, útil y económico es la lejía (diluir una taza de 250 ml en 5 litros de agua). No hay que utilizarla más concentrada pues irritaría las mucosas y alteraciones respiratorias. Los comederos y los areneros, una vez limpios (sin restos macroscópicos), deben estar en contacto con la lejía diluida al menos durante 10 minutos, después se enjuagan y se secan, si es posible al sol. Si la superficie a desinfectar no está totalmente limpia los desinfectantes no podrán hacer efecto, ya que suelen ser inactivados por la materia orgánica.

Del control de la natalidad

Lo mejor para controlar la natalidad es la castración. En las colonias hay que realizarla antes de los 6 meses, pues evitará la primera gestación de las gatas. La vigilancia después de la castración es fundamental. Una buena **analgesia, fluidos, oxígeno y calor** son vitales.

Con esta medida se controla la proliferación y evita los conflictos y la agresividad entre gatos. También disminuye la *felinina* en la orina de los gatos responsable del olor tan fuerte de sus micciones, fuente de conflictos con el vecindario.

Podemos asegurar que la práctica de **Captura-Esterilización-Retorno (CER)** es de las más importantes para el mantenimiento de la salud de la colonia.

Elementos a tener en cuenta para el CER

1. Las jaulas trampa deben ser fáciles y seguras de utilizar. Esas mismas jaulas, desactivadas, pueden utilizarse semanas antes de las capturas para que los gatos se acostumbren a ellas y logremos que coman en su interior.
2. Durante la captura y el transporte debemos tapar la jaula con una manta o toalla. Estarán vigiladas hasta su transporte sobre todo si las condiciones ambientales son extremas (calor o, frío).
3. Además de castrarlos hay que pensar en desparasitación, vacunación en su caso.
4. Sistema de marcaje. Lo más aceptado es la muesca en la oreja izquierda. La implantación de microchips podría ser útil en colonias cerradas y estables.
5. Para minimizar el estrés el gato no debe estar mucho tiempo lejos de la colonia. El entorno donde se despierte después de la cirugía tiene que ser tranquilo, caliente y, si puede ser, con alimento para comer después de recuperarse de la anestesia.
6. Las complicaciones por estas cirugías son mínimas y no está indicado el uso de antibióticos profilácticos de larga duración. Es altamente recomendable la administración intravenosa de fluidos durante la cirugía y el periodo post-quirúrgico inmediato.

De las vacunaciones y las desparasitaciones

1. Aunque solo se vacune al un gato una vez, es mejor que nada. Es posible que no sirva para evitar algunas enfermedades en la colonia, pero sí evitará la aparición de epidemias.
2. Es compatible (y recomendable) realizar la desparasitación y la vacunación en su caso, el día de la castración. Las vacunas actuales son muy efectivas y con margen de seguridad, los animales no sufrirán efectos secundarios, y desarrollarán una respuesta inmune.

La desparasitación, interna y externa, es importante debido al potencial zoonótico de algunos agentes parasitarios que pueden estar presentes en las colonias.

Algunos parásitos pueden portar otros parásitos o agentes infecciosos. Las pulgas son la fuente principal de la infección por tenias. Los gatos, al lamerse y rascarse, acumulan restos que contienen la bacteria debajo de las uñas provocándose heridas.

Cabe resaltar que deberíamos desparasitar interna y externamente a los gatos tan a menudo como la economía de la colonia lo permita. Lo ideal sería 4 veces al año para los parásitos internos y una vez al mes para pulgas y garrapatas. Los productos que tengan un espectro más amplio serán los deseables. Esta medida hará que aumente la calidad de vida de los gatos de la colonia aumentando su resistencia a las enfermedades. Esto debería tratarse en las reuniones con los vecinos para explicar por qué el manejo de una colonia por parte de profesionales revierte en una mejora para la salud pública de todo el vecindario.

De la función social de las asociaciones protectoras del gato “callejero”

Además de la defensa del gato y, las asociaciones y protectoras deben involucrarse para erradicar el problema del abandono y cría indiscriminada de animales sin ningún criterio de responsabilidad. A nuestro entender, las protectoras y las asociaciones son las encargadas ideales de:

1. **Educación y mejora de sensibilidad ciudadana:** Las charlas, seminarios, páginas web, blogs y hojas de información son algunas tareas importantes para un cambio en la educación hacia los animales, no sólo los gatos. Centros cívicos, salas de ayuntamiento o bibliotecas son lugares para montar estos eventos. Los temas más interesantes pueden ser los mismos que los recogidos en estas páginas: Propiedad responsable, vacunas y desparasitación, alimentación de calidad, etc. Puede ser interesante buscar la colaboración ya sea con departamentos de salud, medio ambiente o fabricantes de piensos. Esta colaboración permite ofrecer trípticos sin coste para la asociación o protectora.
2. **Explicar y fomentar la esterilización temprana de los gatos:** no solo de los dados en adopción (de obligado cumplimiento) sino también de los obtenidos de cría directa o en tienda de animales. Explicar los efectos beneficiosos para el gato: la reducción del olor de la orina y disminución de la conducta de marcaje con la misma, disminución de estrés y de peles con otros gatos, reducción de tumores de mama en la gata, y de obesidad, si lo comparamos con una esterilización más tardía.
3. **Formación de voluntarios e intercambio de información y experiencia con otras asociaciones noveles:** Los voluntarios deben estar formados en cómo tratar un gato, cómo evitar dañar y ser dañado, cómo limpiar y desinfectar los utensilios de los felinos, cómo se estructura la asociación y por qué no se deben mezclar animales de orígenes diferentes.

Los veterinarios deben colaborar para la formación de voluntarios y sensibilización de la sociedad.

Desde GEMFE-AVEPA, creemos que no es éticamente aceptable alimentar a los gatos de la calle sin proporcionarles cuidados médicos, esterilización y vacunación en su caso. Eso solo serviría para mantener la proliferación con las consecuencias negativas para todos. Por ello, instamos a las administraciones, a las asociaciones pro-defensa de animales, a los veterinarios y a las asociaciones de vecinos a trabajar unidos.

Fuentes y bibliografía

Lo expuesto es un resumen. El siguiente enlace lleva al documento original y más información

<https://www.avepa.org/index.php/63-grupos/174-gemfe-guias-y-posicionamiento>

Páginas web de interés

<http://www.sheltermedicine.com/>

<http://www.ifcw.net/>

<http://abcd-vets.org/Guidelines/Pages/EN-Prevention-of-Infectious-Diseases-in-Cat-Shelters.aspx>

<http://www.isfm.net/>

<http://www.catvets.com/>